

בדיקות קולונוסקופיה - דרכי העיכול התחלונות

(הכנה לבדיקה עם "מרחון" – בוקר)

ביצוע הבדיקה בין השעות: 07:00-14:00

זמן הגעה לבדיקה: _____

מטופל/ת יקר/ה,
ברור בוואר למכן הגסטרו. ברצוננו להדריך אותך בבדיקה הקולונוסקופיה שתואמה לך.

מהי בדיקת קולונוסקופיה:

בדיקה קולונוסקופיה מאפשרת הסתכלות לתוך חלל מעי הגוף באמצעות אבחנתי וטיפול.

הבדיקה מתבצעת בעזרת קולונוסקופ – צינור גמיש בעובי אצבע הבנוי מסיבים אופטיים שבקצתו מקור אור ומצלמת וידאו זעירה המאפשרת לבדוק הסתכלות ישירה לתוך המעי. עובי הקולונוסקופ מתאים והוא מוחדר דרך פי הטבעת.

לעתים מתבצעות במהלך הבדיקה פעולות כמו לקיחת ביופסיה או כריתת פוליפ.

לפני ביצוע בדיקת קולונוסקופיה יש לדוח לרופא:

- אם אתה/ה אלרגי/ת לתרופה.
- אם יש לך מסתם לב מלאכותי.
- אם אתה/ה נוטל/ת אנטיביוטיקה לפני פעולה פולשנית.
- במידה ואת/ה חולה במחלת כליאתית, חובה להתייעץ עם רופא לגבי חומר ההכנה.

מדלי, דם / תרופות נגדות קריישה:

אם אתה/ה נוטל/ת תרופות נגדות קריישה / מדלי דם (למשל: קוומדין (COUMADIN®), סינטראם (SINTROM®), פלביקס (PLAVIX®), קסרטלו (XARELTO®), אפינט (EFFIENT®) ועודיהם), יש להתייעץ ולשאול עם רופא את הפסקתן או מתן טיפול חילופי שיאפשר כריתת ממצאים באנדוסקופיה.
ביצוע בדיקת קולונוסקופיה תוך המשך טיפול במדלי דם תוכל להתבצע ללא כריתת ממצאים / נטילת ביופסיות דרך האנדוסקופ.

لتשומת ליבך,

אם המעי אינו נקי לחלוtin, אין אפשרות לבצע את הבדיקה.
על מנת להצליח לבצע את הבדיקה, יש>Create>בנקיי המעיים באופן יסודי.
ニקיי המעיים מתבצע על ידי דיאטה דלת תאית (הכנה תזונתית) שמטטרת להפחית שאריות במעי
על ידי מתן תרופות (כדורים משלשלים) שמטטרת ניקוי המעיים.



הנחיות להכנה לבדיקה

הכנה תזונתית לקולונוסקופיה:

מותר לאכול	אסור לאכול	
לחם לבן, פיתה, בוגט, קרקרים מקמח לבן, פסטות, אטריות מקמח לבן, עוף, הודו, דגים.	פירות, ירקות, ציתים, אבוקדו, דגנים עם סיבים , לחם שחורה, לחם חי, לחם מלא, cosaמת, שיבולת שעועל, בורגון, גראנולה, סיבי חיטה, תירס. קטניות – אפונה, שעועית, עדשים, חומוס. פייחחים – גרעינים, שקדים, בוטנים, שומশום, פיסטוקים.	3 ימים לפני הבדיקה
כל מוצר החלב ללא חתיכות פרי, מיצים טבעיים מסוננים. ביצים, מרק צח ללא ירקות, גלי, עוגות לא פירות. שתייה – קפה, חלב, משקאות דיאט.	בשר אדום	
נוזלים צלולים בלבד: מרקים צלולים, תה, מיצים, גלי (לא בצע אדום).	אסור לאכול כל אוכל מוצק ומוצר חלב למייניהם.	24 שעות לפני הבדיקה
	צום מוחלט, ללא נזלים.	3 שעות לפני הבדיקה

* חשוב ! במידה והן מבצעת גם בדיקת גסטרוסקופיה, עליך להיות בצום 6 שעות לפני הבדיקה.

הכנה תרופתית לקולונוסקופיה:

לצורך רכישת התרופות להכנה, יש לגשת לרופא המשפחה לצורך קבלת מרשם עבורו:

- טבליות משלשות: PO Tab. Bisacodyl 5mg (LAXADIN® / ATZIRUT X®) – 4 Tablets
- תמייסת מרוקן: PO Pwd.for Solution MEROKEN® 3 Liter – 1 Bottle
- טבליות נגד בחילה (ניתן לקחת את הtablilioת רק במידה ואין התווויות נגד):
PO Tab. Metoclopramide 10mg (PRAMIN®) – 2 Tablets

אופן נטילת התרופות:

• 3 ימים טרם הבדיקה:

בשעה 20:00 - יש ליטול 2 טבליות משלשות (LAXADIN® / ATZIRUT X®).

• 2 ימים לפני הבדיקה:

בשעה 20:00 - יש ליטול 2 טבליות משלשות (LAXADIN® / ATZIRUT X®).

• 1 יום לפני הבדיקה:

– בשעה 11:30 - יש ליטול 1 טבלייה נגד בחילה (PRAMIN®), במידה ואין התווויות-נגד.

– בשעה 12:00 בצהרים - יש לשותות 2 ליטר של תמייסת מרוקן במשך שעתים, רצוי לשותות בקצב של 250 מ"ל כל 15 דקות.

– בשעה 19:30 - יש ליטול 1 טבלייה נגד בחילה (PRAMIN®), במידה ואין התווויות-נגד.

– בשעה 20:00 - יש לשותות את יתרת תמייסת המרוקן, תוך שעתים.



הנחיות כלליות להכנת תמייסת מרוקן:

- מומלץ לצנן את תמייסת המרוקן על מנת להקל על השטיה.
- אין להוסיף לתמייסת המרוקן תוספות כלשהן.

הנחיות ליום הבדיקה:

- נא הצעידי/ בטעודה מזהה ובהתchyיבות מקופת חולים (מבוטח מכבי פטורים מהתחייבות).
- חובה הגיע עם מלאו שיקח אותו הביתה לאחר הבדיקה מאחר ותהייה/ מטוושש/ת במהלך הבדיקה ומספר שעות אחרת. נהוגה וכל פעילות אחרת הדורשת ערנות אסורה לאחר הבדיקה ובמשך כל היום.
- יש להפסיק לשתוות 3 שעות לפני מועד הבדיקה. המשמעות, צום מוחלט 3 שעות לפני הבדיקה.
- במידה והנרג סובל/ת מליח דם גבוה או ממחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות עד 3 שעות לפני הבדיקה.
- לחולי סוכרת, אסור לקחת תרופות לסוכרת ואסור להזריק אינסולין בבוקר יום הבדיקה אך יש להביא אינסולין ואת כרטיסי המעקב לבדיקה עצמה.
- أنا לבש/י בגדי נוח והשתדל/י להגיע ללא תכשיטים.
- לקרהת הבדיקה, תתבקשי/ לחתום על טופס הסכמה על פי חוק, חתימתך על ההסכם היא תנאי הכרחי לביצוע הבדיקה.
- חשוב ! במידה והנרג מבצע/ת גם בדיקת גסטרוסקופיה, עליך להיות במצב 6 שעות לפני הבדיקה.

מהלך הבדיקה:

משך הבדיקה כ- 30-20 דקות.
 על מנת להפחית את תוחשת חוסר הנוחות בזמן הבדיקה, ניתן לירק זריקת טשטוש לתוך הוריד .
 השהייה במקוון תיארך לפחות שעה לאחר סיום הפעולה (במידה והבדיקה בוצעה תחת טשטוש).
 לאחר הבדיקה תשאירי להשגה במקוון גסטרו עד לההתואשות (זמן הההתואשות שונה מאדם לאדם).
 בתום הההתואשות, תקבל/י תשובה מודפסת מהרופא שביצע את הבדיקה.
 אם נלקחו ביופסיות, התוצאות תימסרנה לאחר כחודש ימים לרופא המטפל או לגסטרואנטרולוג.

תופעות לאחר הבדיקה שחייבים להתיחסות רפואי:

במידה ומופיעות אחת מההתופעות הבאות לאחר הבדיקה, יש לפנות לטיעון רפואי באופן מיידי.

- כאבים עזים בחזה או בבטן.
- עליית חום וצמרמות כיממה לאחר הבדיקה.
- דם בצואה בכמות גדולה.

אם עושים את מירב המאמצים לעמוד במועד זימון התורים כפי שתואמו מולך אך לעיתים, בשל אילוצים לא צפויים, התור מתעכב ועל כך אנו מתנצלים מראש.

ברכת רפואה שלמה,

צוות מכון גסטרו